

La escasa perdiz pardilla (*Perdix perdix*) se refugia entre los brezales y piornales montaños, entre los 1.300 y los 2.000 m de altitud.



búho real (*Bubo bubo*)



El alimoche (*Neophron percnopterus*) regresa todos los años de África para criar en los roquedos. Se alimenta de carroña y boñigas. Su población desciende poco a poco, en Tierras Altas ya sólo anidan tres parejas.

# El norte de la provincia de Soria flora y fauna



El ciervo (*Cervus elaphus*), que antiguamente estaba presente en toda la Península Ibérica, quedó relegado a principios del siglo XX a zonas concretas de los Montes de Toledo y Sierra Morena.

En 1960 se reintrodujo en nuestros montes con fines cinegéticos mediante la suelta de 12 ejemplares en Ostaza procedentes de Córdoba. La ausencia de lobos, su principal predador, ha favorecido su explosión demográfica, causando daños forestales y desplazando del territorio a otro cérvido: el corzo.



apolo (*Parnassius apollo*)



El pardillo común (*Carduelis cannabina*) se alimenta de las semillas de las cardos y otras plantas, como el jilguero.



La collalba gris (*Oenanthe oenanthe*) es el pajarillo más frecuente en los terrenos desarbolados de Tierras Altas. Este insectívoro confiado vuela de oteadero en oteadero mostrando su llamativa cola blanca y negra.

El tejón (*Meles meles*) es frecuente en nuestros campos, pero difícil de observar por sus hábitos nocturnos. Lo que podemos encontrar son sus inconfundibles huellas de cinco dedos y largas uñas, y sus aparatosas tejoneras.



abejarucos (*Merops apiaster*)



En esta comarca al jilguero (*Carduelis carduelis*) se le llama «golorito fino».



El lución (*Anguis fragilis*) es una inofensiva «lagartija sin patas», aunque parece una culebra. Al igual que los sapos (anfibios) y las musarañas (mamíferos), mantiene a raya a las babosas, lombrices, arañas e insectos de las huertas.



sapo común (*Bufo bufo*)



sapo corredor (*Bufo calamita*)



sapo partero (*Alytes obstetricans*)



musaraña común (*Crocidura russula*)



zorzal ailrojo

zorzal real



zorzal común

zorzal chario

mirlo común

Miles de zorzales o «malvices» pasan el invierno en nuestros acebales, donde encuentran refugio y alimento.



La liebre ibérica (*Lepus granatensis*) o «matacán» se diferencia del conejo, entre otras cosas, por sus orejas manchadas de negro.

zorro rojo (*Vulpes vulpes*)



cerezo silvestre (*Prunus avium*)



olmo de montaña (*Ulmus glabra*)



El roble rebollo (*Quercus pyrenaica*) es la frondosa más abundante de estos montes. Son frecuentes los grandes ejemplares (algunos con más de trescientos años) con formación «en cabañera», resultado de las podas para leña, como en las dehesas boyales de Vizmanos y San Andrés.



El arce menor (*Acer campestre*) medra bien sobre los suelos frescos, generalmente mezclado con los robles. En la dehesa de Villar de Maya se conservan ejemplares de gran porte.



lino blanco (*Linum catharticum*)

La encina (*Quercus ilex*) crece en terrenos más secos y soleados que el rebollo, y es especialmente abundante en el tercio este de la comarca, como Valdeavilla, Magaña, Villarjo, etc.



brezo común (*Erica vagans*)

biércol, brecina (*Calluna vulgaris*)

detalle de sus flores

brezo rojo (*Erica australis*)

brezo blanco (*Erica arborea* / *rojiana*)

El líquen geográfico (*Rhizocarpon geographicum*) tapiza las coarzasanitas de las cumbres de Cebollera.



escoba negra (*Cytisus scoparius*)



Semilla de piorno. Estas escobas son muy prolfas, y proliferan tras los incendios ganaderos.

aulaga, aliaga (*Genista scorpius*)

El trebol de prado (*Trifolium pratense*) es una leguminosa: su fruto es una legumbre. También lo son la escoba, el piorno, la aulaga, ... las lentejas y las alubias.

piorno serrano (*Cytisus oromediterraneus*)

cardena o cardo borriquero (*Dipsacus fullonum*)

gordolobo (*Verbascum pulverulentum*)